



Door Monique Carton  
Dierenkliniek 't Spoor

# DIER & GEZONDHEID

## Opvallend: Baarmoederontsteking bij de teef.

*De afgelopen tijd hebben we opvallend veel teven met een baarmoederontsteking gezien, tijd om daar iets over te schrijven.*

### Wat is een baarmoederontsteking

Een teef heeft een Y-vormige baarmoeder. Van buiten naar binnen gezien heeft een hond een vulva (schaamlippen), dan een vagina die na de baarmoedermond (cervix) over gaat in een baarmoeder. De baarmoeder heeft een korte basis (corpus) en splitst dan uit in 2 langwerpige baarmoeder hoorns. Aan het einde van beide hoornen zitten de eierstokken waar de eitjes en de hormonen worden geproduceerd. De baarmoeder (in zijn gehele dus ook de hoornen) is bekleed met een slijm vlies. Als dit slijmvlies gaat ontsteken noemen we dat een baarmoederontsteking of endometritis. Als er dan ook nog pus wordt gevormd noemen we de baarmoederontsteking een pyometra. Als de baarmoedermond openstaat kan de pus naar buiten. Is de baarmoedermond gesloten dan kan de pus niet naar buiten en hoopt de pus op in de baarmoeder; het wordt dan een "zak met pus". Dit noemen we een gesloten pyometra.


### Hoe ontstaat een baarmoederontsteking?

Bij de loopsheid van een hond, maar ook bij een (schijn)dracht, een anti-loopsheid behandeling of tumoren of cystes op de eierstokken zijn er hormonen actief. Onder invloed van deze hormonen veranderd het slijmvlies van de baarmoeder.

Het wordt dan gevoelig voor bacteriën die via de vulva en de vagina omhoog kruipen. Als het slijmvlies gaat ontsteking ontstaat een baarmoeder ontsteking die in een later stadium ook pus kan gaan produceren.

### Wat zijn de symptomen van een baarmoederontsteking?

Meestal ontstaan de problemen zo'n 1-2 maanden na de loopsheid. De teef gaat meestal veel drinken en plassen, wordt meestal futlozer, krijgt koorts, wil soms niet meer eten en gaat uiteindelijk braken. Bij een gesloten baarmoederontsteking zien we geen uitvloeiing, bij een open baarmoederontsteking komt er wit of rode uitvloeiing uit de vulva. De rode uitvloeiing is meer dan normaliter tijdens de loopsheid wordt gezien. Als er sprake is van een gesloten baarmoederontsteking kan de "zak met pus" scheuren en de pus de buik inlopen dan kan shock en sterfte volgen.



Copyright© LifeTeam Inc.

### Hoe wordt een baarmoederontsteking gediagnosticeerd?

Normaal gesproken zijn de baarmoeder hoornen van een hond ongeveer zo dik als een pen. Door de ontsteking kunnen ze zo dik worden als een rookworst en als er sprake is van een gesloten pyometra



## SAMEN ZIJN WIJ EEN GOED TEAM!

ZORG IS HEEL PERSOONLIJK. DANKZIJ DE KLEINE TEAMS WAAR THEBE MEE WERKT, KRIJGT U ALTIJD ZORG VAN IEMAND DIE U KENT.

**Thebe** Wijkverpleging

Buurtteam Oisterwijk & Moergestel  
088 - 117 6762 • [www.thebe.nl](http://www.thebe.nl)

(pus hoopt zich op) kunnen de hoornen zo breed worden als het onderbeen van een volwassen mens. In een aantal gevallen is dus met buik palpatie al een zwaar vermoeden uit te spreken, door de dikte van de baarmoeder. Als er pus uit de vulva loopt bij een open baarmoederontsteking is er aan de hand daarvan een zwaar vermoeden uit te spreken. Met een echo of röntgenfoto stellen we de definitieve diagnose. Omdat het nog wel eens voorkomt dat er behalve een baarmoederontsteking ook suikerziekte of nierfalen voorkomt doen we ook een bloedonderzoek.

### Wat is de behandeling?

Er is maar 1 manier om een baarmoederontsteking te verhelpen, namelijk de baarmoeder en de eierstokken operatief verwijderen. In het geval van een gesloten baarmoederontsteking is dit zelfs een spoed operatie, want we willen scheuren van "de zak met pus" voor zijn. In geval van een open baarmoeder ontsteking is de operatie enkele dagen uit te stellen door het geven van hoge dosissen antibiotica, maar liever niet want als de baarmoedermond sluit of slechts een klein beetje geopend is kan de pus alsnog ophopen. De baarmoederontsteking volledig met antibiotica verhelpen gaat nooit, de operatie is altijd nodig. Ook krijgt de teef een infuus om de afvalstoffen die door de ontsteking in het lichaam ontstaan zo snel mogelijk te verwijderen en natuurlijk antibiotica en pijnstilling.

### Hoe is baarmoederontsteking te voorkomen?

Baarmoederontsteking komt niet voor bij gesteriliseerde teven, omdat de hormonen die eraan ten grondslag liggen dan niet worden geproduceerd. 25 procent van alle niet gesteriliseerde teven ontwikkelen baarmoederontsteking en dat is een van de redenen dat, medisch gezien, het advies is om een teef te laten steriliseren. Omdat niet gesteriliseerde teven ook een hele grote kans hebben op melkkliertumoren (zowel kwaad als goedaardig) en op suikerziekte, zijn er meerdere redenen om een teef te laten steriliseren. Het liefst tussen de 1e en de 2e loopsheid, want hoe jonger ze gesteriliseerd worden hoe groter de kans dat je de problemen voorkomt.



**Ten tijde van de corona maatregelen vervallen onze inloopsprekuren.**

**Voor iedereen succes en gezondheid in deze bijzondere tijd.**

### Openingstijden

- Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
- Zaterdag 09:00 uur tot 12:00 uur

Boxtelsebaan 15, Oisterwijk

**013 - 590 22 28**

info@dierenkliniektspoor.nl

**www.dierenkliniektspoor.nl**

Volg dierenkliniekSpoor op

**Binnenkort nieuw in ons assortiment...**

  
PAINT & PAPER LIBRARY

verf- en behangspecialzaak

Marco van den Berg

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk

013 - 528 21 62

www.marcovandenbergh.nl